



オリザ油化株式会社  
〒493-8001 愛知県一宮市北方町沼田1番地  
TEL (0586)86-5141(代) FAX (0586)86-6191

## 製品規格書

製品名：オリザセラミド<sup>®</sup>-PT (食品)

本品は、イネ科イネ *Oryza sativa* Linne の種子から生ずる米ぬか及び米胚芽からヘキサシロリン酸及びエタノール抽出して得られたものを、粉末化したものである。本品は定量するとき、スフィンゴ糖脂質を3.0 % 以上含む。

<b>性状</b>	淡黄色から黄色の粉末で、わずかに特有なにおい	
<b>確認試験</b>		
フリーセラミド (Elasticamideを含む)	ピークを認める	(HPLC光散乱検出)
<b>スフィンゴ糖脂質含量</b>	3.0 % 以上	(デンシトメトリー法) (HPLC光散乱検出)
<b>乾燥減量</b>	5.0 % 以下	(衛生試験法、1 g、105 °C、2 時間)
<b>純度試験</b>		
(1)重金属 (Pbとして)	10 ppm 以下	(硫化ナトリウム比色法)
(2)ヒ素 (As <sub>2</sub> O <sub>3</sub> として)	1 ppm 以下	(食品添加物公定書、第3法、装置B)
<b>一般生菌数</b>	1×10 <sup>3</sup> 個/g 以下	(衛生試験法、標準寒天培地)
<b>真菌数</b>	1×10 <sup>2</sup> 個/g 以下	(衛生試験法、ポテトデキストロース寒天培地 クロラムフェニコール添加)
<b>大腸菌群</b>	陰性	(衛生試験法、BGLB培地)

<b>組成</b>	<b>成分</b>	<b>含有量</b> (この表示値は目安です)
	米抽出物	25.00 %
	澱粉分解物	1.13 %
	炭酸カルシウム	65.60 %
	カゼインナトリウム (乳由来)	5.00 %
	プルラン	2.00 %
	酵素分解レシチン (大豆由来)	0.57 %
	グリセリン脂肪酸エステル	0.50 %
	キサントガム	0.20 %
	合計	100.00 %

**賞味期限** 製造後 3年間  
**保管方法** 高温、直射日光を避け、密封状態にて保管する。

制定日	2007年 5月17日
改定日	2024年 1月31日
管理No.	U-431EN

(2024.04.01~適用)